SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Protections anatomiques mixtes MoliCare® Pad, réf. 00925*

HARTMANN

- ✔ Protection anatomique mixte
- ✔ Triple coussin absorbant
- ✔ Diffusion rapide de l'urine
- ✔ Neutralisation des odeurs
- ✔ Maintien sûr et discret de la protection dans le sousvêtement
- ✔ Testé sous contrôle dermatologique

Description

- Indiquées pour les fuites urinaires légères à modérées.
- Protection anatomique avec triple coussin absorbant assurant une diffusion rapide de l'urine pour un effet garde au sec immédiat et une neutralisation des odeurs.
- Les élastiques en mousse au niveau de l'entrejambe sont doux.
- Le voile externe en polypropylène est intraversable.
- La bande de fixation adhésive permet un maintien sûr et discret de la protection dans le sousvêtement.

Caractéristiques techniques

- **Composition :** - Nontissé externe : hydrophile, recouvrant la zone ultra absorbante ;
  - Triple coussin : coussin diffuseur, superabsorbant et cellulose défibrée ;
  - Elastiques : en mousse au niveau de l'entrejambe ;
  - Voile externe : en polypropylène intraversable ;
  - Bande de fixation longitudinale adhésive ;
  - Absence de latex.
- **Type de dispositif :** dispositif médical de classe I.
- **Conditionnement :** en sachet de 28 protections. Le numéro de lot figurant sur le produit, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité.
- **Lieu de fabrication :** Allemagne.

Référence		00925MINI	00925MIDI	00925MAXI
Pouvoir absorbant		2 Gouttes	3 Gouttes	4 Gouttes
Dimensions du sachet		210 x 80 x 190 mm	210 x 100 x 225 mm	230 x 125 x 290 mm
Dimensions protection (± 10 mm)		Lo 265 x la 112 mm	Lo 335 x la 132 mm	Lo 430 x la 162 mm
Poids (± 10%)		13 g	19 g	34 g
Performances	Vitesse d'acquisition 1ère miction	25 ml : 20 max. 30 s	25 ml : 30 max. 45 s	50 ml : 50 max. 70 s
	Relargage 1ère miction	25 ml : max. 0,3 g	25 ml : max. 0,5 g	50 ml : max 0,5 g
	Vitesse d'acquisition 2ème miction	25 ml : 50 max. 70 s	25 ml : 60 max. 80 s	50 ml : 120 max. 150 s
	Relargage 2ème miction	50 ml : max. 7,0 g	50 ml : max. 5,0 g	100 ml : max. 5,0 g
	Absorption ISO 11948-1*	321 ml	481 ml	865 ml

*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.